

Dr. med. dent.
Roman Beniashvili
Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie

Prof. Dr. Dr.
Konrad Wangerin
Facharzt Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie
plastische Operationen

„Glück entsteht oft aus kleinen Dingen, Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge.“
Chinesische Weisheit

Was Sie nach einem operativen Eingriff beachten sollten:

1. In den ersten drei Tagen nach dem chirurgischen Eingriff sollten Sie bitte auf Kaffee, schwarzen Tee, alkoholische Getränke, Hitze (Sauna, Sonnenbad) und größere körperliche Anstrengungen verzichten. Bitte erst nach vollständigem Abklingen der örtlichen Betäubung essen.
2. Rauchen Sie bitte während der nächsten drei Tage nicht. Nikotin verzögert die Wundheilung und erhöht das Infektionsrisiko um das Achtfache.
3. Essen Sie möglichst keine Frischmilchprodukte (z.B. Joghurt, Quark). Die darin enthaltenen Milchsäurebakterien können zu Wundheilungsstörungen führen.
4. Zur Verminderung einer postoperativen Schwellung kühlen Sie bitte den Operationsbereich in den ersten drei Tagen. Wir bitten Sie, keine Eispackungen direkt auf die Haut aufzulegen. Diese sollten immer in ein Tuch eingewickelt werden.
5. Der Kopf sollte beim Sitzen und Schlafen möglichst aufrecht gelagert werden, um die in jedem Fall auftretende Schwellung möglichst gering zu halten.
6. Eine geringe Sekretbildung aus der Wunde ist normal. Ein Tropfen Blut mit Speichel vermischt erscheint wie ein Mund voll Blut. Sollte wider Erwarten eine Nachblutung auftreten, beißen Sie bitte für eine halbe Stunde auf ein frisches zusammengerolltes und angefeuchtetes Stofftaschentuch. Falls die von uns verordneten Schmerzmittel nicht wirken sollten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Bitte nehmen Sie keine blutverdünnenden Schmerzmittel ein (z. B. Aspirin).
7. Sollte die Mundöffnung durch die Behandlung leicht eingeschränkt sein, darf Sie dieses nicht beunruhigen. Bemerken Sie jedoch eine starke Einschränkung der Mundöffnung mit massiven Schluckbeschwerden und stärker werdenden Schmerzen, rufen Sie uns bitte unverzüglich an.

Unser Praxisteam wünscht Ihnen gute Genesung!

Dr. med. dent.
Roman Beniashvili
Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie

Prof. Dr. Dr.
Konrad Wangerin
Facharzt Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie
plastische Operationen

Merkblatt für postoperative Medikamenteneinnahme

Bitte nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente wie folgt, nach den Mahlzeiten ein:

- Amoxicillin 1000 mg 3 x täglich (1-1-1)
- Amoxicillin 1000 mg 2 x täglich (1-0-1)
- Augmentan Tabs 875mg 2 x täglich (1-0-1)
- Clindasaar 600 mg 2 x täglich (1-0-1)
- Clindasaar 600 mg 3 x täglich (1-1-1)
- Ibuprofen 600 mg 3 x täglich (1-1-1)
- Novalgin Brausetabletten 3x täglich (1-1-1)
- Novalgin Tropfen 3x täglich 20 Tropfen (1-1-1)
- Paracetamol Suppositorien 250 mg bei Bedarf.
- Paracetamol Suppositorien 500 mg bei Bedarf.
- Isocillin 1,2 Mega 3 x täglich (1-1-1)
- Tavanic 500 mg 1 x täglich (1-0-0)
- Unacid PD Oral 2 x täglich (1-0-1)
- _____

- Nasonex Nasenspray 1x täglich 2 Hübe pro Nasenloch (1-0-0) ab OP Tag für 6 Wochen
- Otriven Nasenspray 3 x täglich 1 Hub pro Nasenloch (1-1-1) ab OP Tag für 14 Tage.
- Otriven Nasenspray 3 x täglich 1 Hub pro Nasenloch (1-1-1) ab OP Tag für 14 Tage.
Anschließend an die Anwendung von Otriven Nasenspray steigen Sie am 15. Tag auf
Euphorbium Nasenspray um.
- Euphorbium Nasenspray 3 x täglich 1 Hub pro Nasenloch (1-1-1) für 4 Wochen.

Sonstiges

- Schnelzverbot für 2 Wochen.
- Schnelzverbot für 6 Wochen.
- Chlorhexamed Mundspülung 3 x täglich nach den Mahlzeiten.
- Prothesenkarenz.
- 36 Stunden Verkehrsuntüchtigkeit

Sollte wider Erwarten eine allergische Reaktion in Form von Rötung, Schwellung, Juckreiz, Blasenbildung oder Unverträglichkeit wie Durchfall, Erbrechen oder Übelkeit auftreten, so nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit uns bzw. mit Ihrem behandelnden Hausarzt auf.